


Заболевания гинекология и акушерство

WWW.ELEDIA.RU

Оглавление

Аменорея, олигоменорея.....	4
Воспаление яичников, бели	6
Вульвит.....	8
Гиперменорея	10
Гипогалактия.....	12
Климакс.....	14
Кольпит (вагинит).....	17
Неполное сокращение матки.....	19
Мастит	20
Меноррагия, нарушение менструального цикла, дисменорея	22
Обморок во время родов	24
Рвота беременных	25
Слабая родовая деятельность	26
Ускоренные роды.....	27
Эклампсия.....	28
Эндометриит.....	30
Хроническое заболевание матки	32

АМЕНОРЕЯ



Спина

VG3 Яо-ян-гуань под остистым отростком IV поясничного позвонка.

VG4 Мин-мэнь под остистым отростком II поясничного позвонка.

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

V25 Да-чан-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV поясничного позвонка.

Грудь

VC2 Цюй-гу на передней срединной линии, на 5 цуней ниже пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

VC4 Гуань-юань на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

E29 Гуй-лай на 2 цуня кнаружи от точки Чжун-цзи VC.3, расположенной на 4 цуня ниже пупка.

Рука

GI4 Хэ-гу на тыле кисти между I и II пястными костями, приблизительно в середине лучевого края II пястной кости.

Нога


RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

RP10 Сюэ-хай при согнутой в коленном суставе ноге на 2 цуня выше верхнего внутреннего края надколенника, в месте возвышения медиальной головки четырехглавой мышцы бедра.

V60 Кунь-лунь в углублении между латеральной лодыжкой и пяточным сухожилием.

R5 Шуй-цюань на 1 цунь прямо вниз от точки Тай-си R.3, кзади и книзу от медиальной лодыжки.

ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧНИКОВ



Спина

V28 Пан-гуан-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком II крестцового позвонка.

V29 Чжун-люй-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III крестцового позвонка.

V31 Шан-ляо в II крестцовом отверстии.

V32 Цы-ляо во III крестцовом отверстии.

V33 Чжун-ляо в IV крестцовом отверстии.

V34 Ся-ляо в V крестцовом отверстии.

Грудь

R11 Хэн-гу на 0,5 цуня кнаружи от точки Цюй-гу VC.2, расположенной на 5 цуней ниже пупка.

VC2 Цюй-гу на передней срединной линии, на 5 цуней ниже пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.

Нога

V40 Вэй-чжун в центре подколенной складки, между сухожилиями двуглавой мышцы бедра и полуперепончатой мышцы. Используют и находят точку при согнутой в колене ноге или когда пациент лежит на животе.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.


RP7 Лоу-гу на внутренней поверхности голени, у заднего края большеберцовой кости, на 6 цуней выше вершины медиальной лодыжки, на 3 цуня выше точки Сань-инь-цзяо RP.6.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

E37 Шан-цзюй-сую на 6 цуней ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Цзу-сань-ли E.36, на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

E39 Ся-цзюй-сую на 9 цуней ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Шан-цзюй-сую E.37, на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости, в месте сближения передней большеберцовой мышцы и длинного разгибателя пальцев.

ВУЛЬВИТ



Спина

V25 Да-чан-шу на 1,5 цуня кнаружи от места иод остистым отростком IV поясничного позвонка.

V31 Шан-ляо в Т крестцовом отверстии.

V32 Цы-ляо во II крестцовом отверстии.

V33 Чжун-ляо в III крестцовом отверстии.

V34 Ся-ляо в IV крестцовом отверстии.

VG1 Чан-цян в углублении на 0,5 цуня книзу от вершины копчика, на середине расстояния между копчиком и анусом. Используют точку, когда пациент лежит на животе.

Грудь

VC2 Цюй-гу на передней срединной линии, на 5 цуней ниже пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

VC4 Гуань-юань на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

E30 Ци-чун на 2 цуня кнаружи от точки Цюй-гу VC.2, расположенной на 5 цуней ниже пупка, на паховой складке у медиального края бедренной артерии.

Рука

C8 Шао-фу на ладонной поверхности кисти между IV и V пястными костями, на уровне точки Лао-гун MC.8. При сгибании кисти в кулак кончик мизинца соответствует расположению точки.

Нога

E31 Би-гуань на соединительной линии между верхней передней подвздошной остью и латеральным краем надколенника, на уровне ягодичной складки.


V60 Кунь-лунь в углублении между латеральной лодыжкой и пяточным сухожилием.

R10 Инь-гу при согнутой в коленном суставе ноге на внутреннем конце подколенной складки, между сухожилиями полуперепончатой и полусухожильной мышц.

R2 Жань-гу в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

F11 Инь-лянь на 2 цуня ниже точки Ци-чун E.30, у наружного края длинной приводящей мышцы бедра, на 2 цуня кнаружи и на 2 цуня вниз от точки Цюй-гу VC.2, расположенной на 5 цуней ниже пупка у верхнего края лобкового симфиза.

ГИПЕРМЕНОРЕЯ



Грудь

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

VC4 Гуань-юань на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

VC6 Ци-хай на передней срединной линии, на 1,5 цуня ниже пупка.

E29 Гуй-лай на 2 цуня кнаружи от точки Чжун-цзи VC.3, расположенной на 4 цуня ниже пупка.

Рука

P5 Чи-цзэ при слегка согнутой в локтевом суставе руке на локтевой складке у лучевой стороны сухожилия двуглавой мышцы плеча.

Нога

F1 Да-дунь на наружной стороне большого пальца стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.

F3 Тай-чун на тыле стопы, в переднем углублении места схождения I и II плюсневых костей.

RP2 Да-ду в углублении с переди от внутреннего края плюснефалангового сочленения большого пальца стопы, в месте перехода тыльной поверхности стопы в подошвенную.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.


RP8 Ди-цзи у заднего края внутренней поверхности большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Инь-лин-цюань RP.9.

V40 Вэй-чжун в центре подколенной складки, между сухожилиями двуглавой мышцы бедра и полуперепончатой мышцы. Используют и находят точку при согнутой в колене ноге или когда пациент лежит на животе.

R8 Цзяо-синь на 0,5 цуня кпереди от точки Фу-лю R.7, у заднего края внутренней поверхности большой берцовой кости.

R10 Инь-гу при согнутой в коленном суставе ноге на внутреннем конце подколенной складки, между сухожилиями полуперепончатой и полусухожильной мышц.

ГИПОГАЛАКТИЯ



Спина

V17 Гэ-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком VII грудного позвонка.

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

Грудь

RP19 Сюн-сян на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, в III межреберном промежутке.

E18 Жу-гэнь в V межреберном промежутке, прямо вниз от соска, на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии.

MC1 Тянь-чи в IV межреберном промежутке, на 1 цунь кнаружи от соска и на 5 цуней кнаружи от передней срединной линии.

Рука

МС4 Си-мэнь на 5 цуней выше лучезапястной складки, между сухожилием длинной ладонной мышцы и сухожилием лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной кверху ладони.

С1 Цзи-цюань при отведенной руке в центре подмышечной впадины, у медиальной стороны подмышечной артерии.

G14 Хэ-гу на тыле кисти между I и II пястными костями, приблизительно в середине лучевого края II пястной кости.

TR6 Чжи-гоу на 3 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между локтевой и лучевой костями.

IG1 Шао-цзэ на локтевой стороне мизинца, приблизительно на 0,1 цуня кнаружи от угла ногтя.


IG2 Цянь-гу при сжатой в кулак кисти в углублении кпереди от локтевого края V пястно-фалангового сустава, на конце поперечной складки, на границе тыльной и ладонной поверхности кисти.

Нога

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

КЛИМАКС



Спина

VG14 Да-чжуй под остистым отростком VII шейного позвонка.

V11 Да-чжу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком I грудного позвонка.

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

V29 Чжун-люй-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III крестцового позвонка.

V31 Шан-ляо в Т крестцовом отверстии.

V43 Гао-хуан на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV грудного позвонка.

V54 Чжи-бянь на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV крестцового позвонка.

Грудь

R18 Ши-гуань на 0,5 цуня кнаружи от точки Цзянь-ли VC.11, расположенной на 3 цуня выше пупка.

MC1 Тянь-чи в IV межреберном промежутке, на 1 цунь кнаружи от соска и на 5 цуней кнаружи от передней срединной линии.

VC12 Чжун-вань на передней срединной линии, на 4 цуня выше пупка. Синь-шэ кнаружи от точки юнь-мэнь под акромиальным концом ключицы, во впадине, находящейся между клювовидным отростком лопатки и головкой плечевой кости.

VB23 Чжэ-цзинь на 1 цунь впереди от точки Юань-е VB.22, в IV межреберном промежутке, на уровне соска.

F13 Чжан-мэнь у конца XI ребра. Находят и используют точку, когда пациент лежит на боку с выпрямленной нижней ногой, согнутой верхней ногой и поднятой рукой.

Голова

VG20 Бай-хуэй на срединной линии головы, на 7 цуней выше задней границы роста волос, на 5 цуней кзади от передней границы роста волос, на линии, соединяющей кончики ушей. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) говорится, что точка расположена

VB6 Сюань-ли в месте соединения нижней 1/4 и верхних 3/4 дугообразной линии между точками Тоу-вэй E.8 и Цюй-бинь VB.7.

VB12 Вань-гу в углублении у задне-нижнего края сосцевидного отростка височной кости.

VB20 Фэн-чи под затылочной костью, на уровне точки Фэн-фу VG.16, в углублении между верхними концами грудино-ключично-сосцевидной и трапецевидной мышц.

Рука

МС6 Нэй-гуань на 2 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной вверх ладони.

С1 Цзи-цюань при отведенной руке в центре подмышечной впадины, у медиальной стороны подмышечной артерии.

С5 Тун-ли у лучевой стороны сухожилия локтевого сгибателя запястья, на 1 цунь выше проксимальной лучезапястной складки.

С7 Шэнь-мэнь у локтевого края проксимальной лучезапястной складки, у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя запястья, в щели между гороховидной и локтевой костями.

GI11 Цюй-чи при согнутой в локтевом суставе руке в углублении у лучевого края локтевой складки.

GI14 Би-нао на линии, соединяющей точки Цюй-чи GI.11 и Цзянь-юй GI.15, на 7 цуней выше точки Цюй-чи GI.11, у нижнего края дельтовидной мышцы.

Нога

VB30 Хуань-тяо на границе наружной 1/3 и внутренних 2/3 линии, соединяющей большой вертел бедренной кости и крестцовую щель. Находят и используют точку, когда пациент лежит на боку с выпрямленной нижней ногой и согнутой верхней ногой.

Е36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.


Е44 Нэй-тин на тыле стопы, на конце щели между II и III пальцами.

VB39 Сюань-чжун на 3 цуня выше латеральной лодыжки, в углублении между передним краем малоберцовой кости и сухожилием короткой малоберцовой мышцы.

R2 Жань-гу в углублении впереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

КОЛЬПИТ



Спина

VG.10 Лин-тай под остистым отростком VI грудного позвонка.

VG4 Мин-мэнь под остистым отростком II поясничного позвонка.

V25 Да-чан-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV поясничного позвонка.

V26 Гуань-юань-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком V поясничного позвонка.

V30 Бай-хуань-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV крестцового позвонка.

V33 Чжун-ляо в III крестцовом отверстии.

V52 Чжи-ши на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком II поясничного позвонка.

Грудь

VC2 Цюй-гу на передней срединной линии, на 5 цуней ниже пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

R12 Да-хэ на 0,5 цуня кнаружи от точки Чжун-цзи VC.3, расположенной на 4 цуня ниже пупка.

E29 Гуй-лай на 2 цуня кнаружи от точки Чжун-цзи VC.3, расположенной на 4 цуня ниже пупка.

Нога

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.


RP8 Ди-цзи у заднего края внутренней поверхности большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Инь-лин-цюань RP.9.

RP9 Инь-лин-цюань в углублении у нижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, в углублении между задним краем большеберцовой кости и икроножной мышцей.

F11 Инь-лянь на 2 цуня ниже точки Ци-чун E.30, у наружного края длинной приводящей мышцы бедра, на 2 цуня кнаружи и на 2 цуня вниз от точки Цюй-гу VC.2, расположенной на 5 цуней ниже пупка у верхнего края лобкового симфиза.

Неполное сокращение матки

НЕПОЛНОЕ СОКРАЩЕНИЕ МАТКИ



Спина

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

Грудь

VC2 Цюй-гу на передней срединной линии, на 5 цуней ниже пупка, в середине верхнего края лобкового симфиза.

Рука

TR6 Чжи-гоу на 3 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между локтевой и лучевой костями.

Нога

F3 Тай-чун на тыле стопы, в переднем углублении места схождения I и II плюсневых костей.


F8 Цюй-цюань при согнутой в коленном суставе ноге в углублении у медиального конца подколенной складки.

R8 Цзяо-синь на 0,5 цуня кпереди от точки Фу-лю R.7, у заднего края внутренней поверхности большой берцовой кости.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мышелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

МАСТИТ



Спина

V19 Дань-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком X грудного позвонка.

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

V43 Гао-хуан на 3 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV грудного позвонка.

IG10 Нео-шу прямо вверх от точки Цзянь-чжэнь IG.9, в углублении под остью лопатки.

VB21 Цзянь-цзин посередине линии, соединяющей точку Да-чжуй VG.14 и латеральный край акромиона.

Грудь

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

VC17 Тянь-чжун на передней срединной линии, между сосками, на уровне IV межреберного промежутка

E16 Ин-чуан прямо вверх от соска, в III межреберном промежутке, на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии.

E18 Жу-гэнь в V межреберном промежутке, прямо вниз от соска, на 4 цуня кнаружи от передней срединной линии.

E25 Тянь-шу на 2 цуня кнаружи от пупка.

RP18 Тянь-си на 2 цуня кнаружи от соска, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, в IV межреберном промежутке.

MC1 Тянь-чи в IV межреберном промежутке, на 1 цунь кнаружи от соска и на 5 цуней кнаружи от передней срединной линии.

R22 Бу-лан в V межреберном промежутке, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии.

Рука

P7 Ле-цюэ верхнего края шиловидного отростка лучевой кости, на 1,5 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилием плечелучевой мышцы и сухожилием мышцы, отводящей большой палец кисти. Для нахождения точки часто применяется следующий способ: пациент скрещивает руки через промежутки между большими и указательными пальцами. Точка Ле-цюэ P.7 находится в углублении на уровне конца указательного пальца.

P10 Юй-цзи у середины I пьстной кости, на границе ладонной и тыльной поверхности кисти.

MC7 Да-лин посередине лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при обращенной кверху ладони.


Нога

R6 Чжао-хай в углублении у нижнего края медиальной лодыжки.

VB41 Цзу-линь-ци между IV и V плюсневых костями, в углублении у латеральной стороны сухожилия разгибателя мизинца стопы, на 1,5 цуня кверху от точки Ся-си VB.43.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

МЕНОРРАГИЯ



Спина

V23 Шэнь-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком III поясничного позвонка.

Грудь

E25 Тянь-шу на 2 цуня кнаружи от пупка.

E29 Гуй-лай на 2 цуня кнаружи от точки Чжун-цзи VC.3, расположенной на 4 цуня ниже пупка.

R14 Сы-мань на 0,5 цуня кнаружи от точки Ши-мэнь VC.5, расположенной на 2 цуня ниже пупка.

R15 Чжун-чжу на 0,5 цуня кнаружи от точки Инь-цзяо VC.7, расположенной на 1 цунь ниже пупка.

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

VC4 Гуань-юань на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

Нога

RP1 Инь-бай на внутренней стороне большого пальца стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

RP8 Ди-ци у заднего края внутренней поверхности большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Инь-лин-цюань RP.9.

RP9 Инь-лин-цюань в углублении у нижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, в углублении между задним краем большеберцовой кости и икроножной мышцей.

R2 Жань-гу в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

R6 Чжао-хай в углублении у нижнего края медиальной лодыжки.

R8 Цзяо-синь на 0,5 цуня кпереди от точки Фу-лю R.7, у заднего края внутренней поверхности большой берцовой кости.

F8 Цюй-цюань при согнутой в коленном суставе ноге в углублении у медиального конца подколенной складки.


F9 Инь-бао на 4 цуня выше медиального мыщелка бедренной кости, у заднего края портняжной мышцы.

VB39 Сюань-чжун на 3 цуня выше латеральной лодыжки, в углублении между передним краем малоберцовой кости и сухожилием короткой малоберцовой мышцы.

VB41 Цзу-линь-ци между IV и V плюсневыми костями, в углублении у латеральной стороны сухожилия разгибателя мизинца стопы, на 1,5 цуня кверху от точки Ся-си VB.43.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

ОБМОРОК ВО ВРЕМЯ РОДОВ




Голова

VG26 Шуй-гоу в носогубной борозде, на границе ее верхней 1/3 и нижних 2/3.

Рука

MC6 Нэй-гуань на 2 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной кверху ладони.

РВОТА БЕРЕМЕННЫХ



Спина

V19 Дань-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком X грудного позвонка.

Голова

E11 Ци-шэ над верхним краем ключицы, между грудинной и ключичной головками грудино-ключично-сосцевидной мышцы, прямо вниз от точки Жэнь-ин E.9, на 1,5 цуня кнаружи от точки Тянь-ту VC.22.

Рука

MS6 Нэй-гуань на 2 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной кверху ладони.

MS7 Да-лин посередине лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при обращенной кверху ладони.


Нога

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

Е36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

Слабая родовая деятельность

СЛАБАЯ РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Грудь

VC3 Чжун-цзи на передней срединной линии, на 4 цуня ниже пупка, на 1 цунь выше верхнего края лобкового симфиза.

Рука

GI4 Хэ-гу на тыле кисти между I и II пястными костями, приблизительно в середине лучевого края II пястной кости.

Нога

F3 Тай-чун на тыле стопы, в переднем углублении места схождения I и II плюсневых костей.


V60 Кунь-лунь в углублении между латеральной лодыжкой и пяточным сухожилием.

RP6 Сань-инь-цзяо на 3 цуня выше вершины медиальной лодыжки, у заднего края медиальной поверхности большеберцовой кости.

Е36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

Ускоренные роды

УСКОРЕННЫЕ РОДЫ



Голова

VG26 Шуй-гоу в носогубной борозде, на границе ее верхней 1/3 и нижних 2/3.

Рука


MC6 Нэй-гуань на 2 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья. Используют точку при разогнутой в локтевом суставе руке и обращенной кверху ладони.

Нога

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

F2 Син-цзянь на тыле стопы, на складке между I и II пальцами стопы, в углублении кпереди от I и II плюснефаланговых суставов.

ЭКЛАМПСИЯ



Голова

VG16 Фэн-фу на задней срединной линии, на 1 цунь выше задней границы роста волос, в углублении между трапециевидными мышцами, между затылочной костью и I шейным позвонком.

VG20 Бай-хуэй на срединной линии головы, на 7 цуней выше задней границы роста волос, на 5 цуней кзади от передней границы роста волос, на линии, соединяющей кончики ушей. В книге «Чжэнь цзю цзя и цзин» (Канон основ иглоукалывания и прижигания, 282 г.) говорится, что точка расположена

Тай-ян в углублении на 1 цунь кзади от середины расстояния между наружным углом глаза и наружным краем брови.

VB20 Фэн-чи под затылочной костью, на уровне точки Фэн-фу VG.16, в углублении между верхними концами грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц.

V10 Тянь-чжу на затылочной границе роста волос, в углублении у наружного края трапециевидной мышцы, на 1,3 цуня кнаружи от точки Я-мэнь VG.15.

Рука

TR4 Ян-чи в середине тыльной лучезапястной складки, в углублении у локтевого края сухожилия общего разгибателя пальцев.


TR5 Вай-гуань на 2 цуня выше тыльной лучезапястной складки, между лучевой и локтевой костями.

Нога

VB34 Ян-лин-цюань в углублении у передне-нижнего края головки малоберцовой кости.

E36 Цзу-сань-ли на 3 цуня ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости (точки Ду-би E.35), на один поперечный палец латеральнее гребня большеберцовой кости.

ЭНДОМЕТРИТ



Спина

V30 Бай-хуань-шу на 1,5 цуня кнаружи от места под остистым отростком IV крестцового позвонка.

V31 Шан-ляо в Т крестцовом отверстии.

V32 Цы-ляо во II крестцовом отверстии.

V33 Чжун-ляо в III крестцовом отверстии.

V34 Ся-ляо в IV крестцовом отверстии.

Грудь

RP12 Чун-мэнь на паховой складке на уровне верхнего края лобкового симфиза, на 3,5 цуня кнаружи от точки Цюй-гу VC.2.

E24 Хуа-жоу-мэнь на 2 цуня кнаружи от точки Шуй-фэнь VC.9, расположенной на 1 цунь выше пупка.

E25 Тянь-шу на 2 цуня кнаружи от пупка.

VB26 Дай-май прямо вниз от точки Чжан-мэнь F.13, на уровне пупка.

VB27 У-шу кпереди от верхней передней подвздошной ости, на уровне точки Гуань-юань VC.4, на 3 цуня кпереди и книзу от точки Дай-май VB.26.

Рука

MC5 Цзянь-ши на 3 цуня выше лучезапястной складки, между сухожилием длинной ладонной мышцы и сухожилием лучевого сгибателя запястья.

C6 Инь-си на лучевой стороне сухожилия локтевого сгибателя кисти, на 0,5 цуня выше проксимальной лучезапястной складки.

Нога


RP8 Ди-цзи у заднего края внутренней поверхности большеберцовой кости, на 3 цуня ниже точки Инь-лин-цюань RP.9.

RP10 Сюэ-хай при согнутой в коленном суставе ноге на 2 цуня выше верхнего внутреннего края надколенника, в месте возвышения медиальной головки четырехглавой мышцы бедра.

V55 Хэ-ян между головками икроножной мышцы, на 2 цуня прямо вниз от середины подколенной ямки — точки Вэй-чжун V.40.

F5 Ли-гоу на 5 цуней выше вершины медиальной лодыжки, в середине внутренней поверхности большеберцовой кости.

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ



Грудь

E28 Шуй-дао на 2 цуня کنارужи от точки Гуань-юань VC.4, расположенной на 3 цуня ниже пупка.

R14 Сы-мань на 0,5 цуня کنارужи от точки Ши-мэнь VC.5, расположенной на 2 цуня ниже пупка.

R18 Ши-гуань на 0,5 цуня کنارужи от точки Цзянь-ли VC.11, расположенной на 3 цуня выше пупка.

VC4 Гуань-юань на передней срединной линии, на 3 цуня ниже пупка.

VB28 Вэй-дао кпереди и книзу от верхней передней подвздошной ости, на 0,5 цуня кпереди и книзу от точки У-шу VB.27.

Нога

R1 Юн-цюань в середине подошвы, между II и III плюсневыми костями, в углублении, образующемся при поджатию пальцев стопы, на 1/3 расстояния от основания II - III пальцев до заднего края пятки, на 2/5 расстояния от кончика II пальца до заднего края пятки.

R2 Жань-гу в углублении кпереди от нижнего края бугорка ладьевидной кости.

R8 Цзяо-синь на 0,5 цуня кпереди от точки Фу-лю R.7, у заднего края внутренней поверхности большой берцовой кости.

F8 Цюй-цюань при согнутой в коленном суставе ноге в углублении у медиального конца подколенной складки.

V60 Кунь-лунь в углублении между латеральной лодыжкой и пяточным сухожилием.

RP1 Инь-бай на внутренней стороне большого пальца стопы, приблизительно на 0,1 цуня от угла ногтя.